©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

Systematisch-faunistisches Verzeichnis der Pterophoriden Ungarns, Nr. 2, Ergänzungen (Lepidoptera: Pterophoridae)

von

Imre FAZEKAS

Zusammenfassung: Drei Arten von Pterophoridae sind als ein Supplementum zum systematischen Verzeichnis von 1992 neu für Ungarn zu melden: *Stenoptilia annadactyla* SUTTER, *S. gratiolae* GIBEAUX & NEL und *S. stigmatoides* SUTTER & SKYVA.

Systematic and faunistic list of the Pterophoridae of Hungary, no. 2, addenda (Lepidoptera: Pterophoridae)

Abstract: Three Pterophoridae species new to the fauna of Hungary are listed as a supplementum to the checklist published in 1992: *Stenoptilia annadactyla* SUTTER, *S. gratiolae* GIBEAUX & NEL and *S. stigmatoides* SUTTER & SKYVA.

In meiner früheren Studie (FAZEKAS 1992) teilte ich die systematischen und faunistischen Daten von 54 Arten mit. In der letzten Zeit sind 3 weitere Arten bekannt geworden, und dadurch stieg die Zahl der aus Ungarn bekannten Arten auf 57. Bei der geographischen Verbreitung der Arten verwende ich die in der ungarischen Literatur im allgemeinen verwendeten geographischen Benennungen der Regionen (siehe FAZEKAS 1992, Karte, Abb. 1).

Aufgrund der Genitalien-Untersuchungen haben sich folgende Arten als neu für die Fauna Ungarns erwiesen:

Nachr. entomol. Ver. Apollo, Frankfurt/Main, N.F. **15** (1/2): 25–27, Juni 1994;
ISSN 0723-9912.

Eingang: 31. XII. 1992

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at



Abb. 1: Die Verbreitung von *Stenoptilia gratiolae* GIBEAUX & NEL, *S. annadactyla* SUTTER und *S. stigmatoides* SUTTER & SKYVA in Ungarn. Karte mit UTM-Raster.

©Entomologischer Verein Apollo e.V. Frankfurt am Main; download unter www.zobodat.at

Stenoptilia annadactyla SUTTER 1988

Vorkommen in Ungarn: Dk (Vértes-Gebirge, „Ökörállás"). Nur ein Fundort bekannt. Flugzeit 22. VIII. 1980.

Stenoptilia gratiolae GIBEAUX & NEL 1990

Vorkommen in Ungarn: Dd (Kaposvár), Dk (Budapest, Cinkota), Ek (nur im Bükk-Gebirge). Flugzeit: VI, VII, VIII, X.

Stenoptilia stigmatoides SUTTER & SKYVA 1992

Vorkommen in Ungarn: Ek (nur im Bükk- und Mátra-Gebirge). Flugzeit: VI, VII, VIII.

Nach meinen bisherigen Untersuchungen ist somit für Ungarn das Vorkommen von folgenden *Stenoptilia*-Arten belegt:

Stenoptilia HÜBNER 1825
S. pelidnodactyla STEIN 1837
S. graphodactyla TREITSCHKE 1833 (nur Literaturangabe!)
S. coprodactyla STAINTON 1851
S. zophodactyla DUPONCHEL 1840
S. bipunctidactyla SCOPOLI 1763
S. plagiodactyla STAINTON 1851
S. annadactyla SUTTER 1988 (neu für die Fauna Ungarns!)
S. gratiolae GIBEAUX & NEL 1990 (neu für die Fauna Ungarns!)
S. pterodactyla LINNAEUS 1761
S. stigmatodactyla ZELLER 1852
S. stigmatoides SUTTER & SKYVA 1992 (neu für die Fauna Ungarns!)

Literatur

FAZEKAS, I. (1992): Systematisch-faunistisches Verzeichnis der Pterophoriden Ungarns. – Nachr. entomol. Ver. Apollo, Frankfurt am Main, N.F. **13** (2a): 191–200.

Anschrift des Verfassers:

Imre FAZEKAS, Komlóer Naturhistorische Sammlung, H-7300 Komló, Városház tér 1, Ungarn